



ระเบียบกองทัพไทย
ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘.๔ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มเติมความในข้อ ๒.๑.๖ มือหรือเท้า ของผนวกการกำหนดลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกาย และโรคที่ขัดต่อการรับเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารท้ายระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ ดังนี้

“๒.๑.๖.๖ ภาวะเท้าแบนยึดติด (RIGID TYPE)”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

พลเอก 

(ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร)

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หมายเหตุ เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม ผนวกการกำหนดลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกาย และโรคที่ขัดต่อการรับเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เนื่องจากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน “ภาวะเท้าแบนยึดติด (RIGID TYPE)” เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการศึกษาอบรมในโรงเรียนเตรียมทหาร สมควรกำหนดลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกายที่ขัดต่อการรับเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารเสียใหม่ ให้มีความเหมาะสม จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมผนวกดังกล่าว

ผนวกประกอบระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
การกำหนดลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกายและโรคที่ขัดต่อการรับเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จะต้องมีความสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่มีโรคและความพิการ ดังต่อไปนี้

๑. ขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกาย

๑.๑ ความสูง น้ำหนัก การขยายของอกเมื่อหายใจเข้าและหายใจออกให้เป็นไปตามขนาดของนักเรียนเตรียมทหารตามที่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

๑.๒ ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายได้สัดส่วนอยู่ในเกณฑ์ปกติ

๒. ไม่มีโรคและความพิการหรือภาวะความไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย ดังต่อไปนี้

๒.๑ ร่างกายผิดปกติหรือพิกลรูป หรือพิการ

๒.๑.๑ ศีรษะ และหน้าผกผิดปกติ

๒.๑.๒ ฝ่ามือหรือฝ่าเท้าแบนผิดปกติ

๒.๑.๓ รูปร่างผิดปกติ (Malformation) ของริมฝีปากหรือจมูก เช่น ปากหรือจมูกแหว่ง ริมฝีปากแหว่ง หรือเขตริมผิดปกติ หรือหุบลง

๒.๑.๔ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน

๒.๑.๕ แขน ขา

๒.๑.๕.๑ ยาวไม่เท่ากัน หรือผิดปกติมองเห็นได้ชัด

๒.๑.๕.๒ โค้งเข้าหรือออก

๒.๑.๕.๓ บิดเก

๒.๑.๖ มือ หรือ เท้า

๒.๑.๖.๑ บิดเก

๒.๑.๖.๒ นิ้วมือ หรือนิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บ

๒.๑.๖.๓ นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ามีจำนวนเกินกว่า หรือน้อยกว่าปกติ

๒.๑.๖.๔ นิ้วบิดเก และทำงานไม่ถนัด

๒.๑.๖.๕ ช่องระยะนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าติดกัน

๒.๑.๖.๖ ภาวะเท้าแบนยึดติด(Rigid Type)*

๒.๑.๗ ร่างกายผิดปกติรูปผิดปกติ

๒.๒ กระดูกและกล้ามเนื้อ

๒.๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวน้อยกว่าปกติ จนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นๆ ใช้งานไม่ได้

๒.๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ

/๒.๒.๓ ข้ออักเสบ...

* หมายเหตุ: ข้อ ๒.๑.๖.๖. แก้ไขเพิ่มเติมตามอนุมัติ ผบ.ทสส. ท้ายหนังสือ สปท. ที่ กท.....ลง..... ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่.....เป็นต้นไป โดยการตรวจให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานซึ่งมีอยู่ ๓ วิธี คือ การพิมพ์เท้าและใช้คอมพิวเตอร์ในการวัดค่าอัตราส่วนตรงอุ้งเท้าหารด้วยสันเท้า และการ x-ray เท้า

- ๒.๒.๓ ข้ออักเสบกระดูกเปลี่ยนรูป
- ๒.๒.๔ คอเอียง หรือแข็งทื่อเนื่องจากกระดูก หรือกล้ามเนื้อพิการ
- ๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น
- ๒.๒.๖ เท้าปุก (Clup foot)
- ๒.๒.๗ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis)
- ๒.๒.๘ กระดูกหักต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
- ๒.๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ หรือดีสโทรฟี (Dystrophy)
- ๒.๓ ผิวหนัง
 - ๒.๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิด ซึ่งเป็นเรื้อรังยากต่อการรักษา หรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้อื่น
 - ๒.๓.๒ สีบริเวณหน้า คอ หรือลำตัว ซึ่งเป็นมากจนแลดูน่าเกลียด
 - ๒.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนัง ซึ่งยากต่อการรักษา
 - ๒.๓.๔ แผลเป็น หรือปานที่หน้ามีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ้นไป หรือมีความยาวมากจนแลดูน่าเกลียด
 - ๒.๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ที่หน้ามีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ ซม. ขึ้นไป
 - ๒.๓.๖ แผลเป็น ฝ้า ปาน รอยสัก หูด (Wart) หรือซีสต์ (Cyst) ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด
 - ๒.๓.๗ คนเผือก (Albino)
 - ๒.๓.๘ เนื้องอกเล็กๆ เป็นปุ่มๆ ที่ผิวหนังทั่วร่างกาย (Molluscum fibrosom)
- ๒.๔ ตา
 - ๒.๔.๑ ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏได้ชัด
 - ๒.๔.๒ ต้อกระจก (Cataracy)
 - ๒.๔.๓ แผลเป็นที่กระจกตา หรือกระจกตาขุ่น (Comeal ulcer or opacity of comea)
 - ๒.๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmua)
 - ๒.๔.๕ หนังตาดก (Ptosis) หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตาม้วนเข้าใน (Entropion)
 - ๒.๔.๖ สายตาคิดปกติ
 - ๒.๔.๗ บอดสี
 - ๒.๔.๘ ขนต้าย้อยเข้าข้างใน หรือย้อยออกข้างนอก (Trichiasis or districhiasis)
 - ๒.๔.๙ หนังตาแหงจนเสียรูป
 - ๒.๔.๑๐ ขอบหนังตาทึบมาก หรือเรื้อรัง
 - ๒.๔.๑๑ หนังตาคิดไม่สนิท
 - ๒.๔.๑๒ ซีสต์ของหนังตา
 - ๒.๔.๑๓ กระจกตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง
 - ๒.๔.๑๔ เยื่อตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง
 - ๒.๔.๑๕ ริดสีดวงตา (Trachoma)

- ๒.๔.๑๖ ต้อเนื้อซึ่งงอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่า ๑ มม.
- ๒.๔.๑๗ ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด
- ๒.๔.๑๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis)
- ๒.๔.๑๙ ต้อหิน (Glaucoma)
- ๒.๔.๒๐ ช่องหนังตา (palpebral fissure) กว้างไม่เท่ากันจนแลดูน่าเกลียด

๒.๕ หู คอ จมูก

- ๒.๕.๑ ใบหูผิดขนาด หรือผิดรูปจนปรากฏชัด
- ๒.๕.๒ ช่องหูชั้นนอกอักเสบอย่างเรื้อรัง หรือช่องหูชั้นกลางอักเสบ
- ๒.๕.๓ เยื่อหุ้มหว่า (Retracted ear Drum) มากจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
- ๒.๕.๔ เยื่อหูทะลุ
- ๒.๕.๕ การได้ยินเสียงของหูผิดปกติ
- ๒.๕.๖ กระจกมาสตอยส์อักเสบ
- ๒.๕.๗ เคยผ่าตัดกระจกมาสตอยส์ออกทั้งหมด (Radical Mastoidectomy)
- ๒.๕.๘ การพูดผิดปกติทั้งเสียง และการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก
- ๒.๕.๙ ความพิการที่ทำให้ลำคอทำงานไม่ได้ตามปกติ
- ๒.๕.๑๐ เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด
- ๒.๕.๑๑ ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก
- ๒.๕.๑๒ จมูกบีบผิดปกติ หรือจมูกบีบเล็กน้อยและพูดไม่ชัด
- ๒.๕.๑๓ จมูกโหว่ไม่มีโครง
- ๒.๕.๑๔ ฝากระบังช่องจมูกคด หรือมีกระดูกยื่น หรืองอก (Septal deviation, Spurs and ridges) หรือจมูกอักเสบชนิดโตขึ้น (Hypertrophic rhinitis) ทั้งหมดนี้จะต้องมีความผิดปกติมากกว่าครึ่งหนึ่งของช่องจมูก
- ๒.๕.๑๕ ฝากระบังช่องจมูกทะลุ
- ๒.๕.๑๖ เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic rhinitis)
- ๒.๕.๑๗ เนื้องอกในจมูก (Nasal polyp)
- ๒.๕.๑๘ โพรงกระดูกข้างจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis)

๒.๖ ฟัน

๒.๖.๑ มีฟันไว้เคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ คือกำหนดให้มีฟันกราม (Molars) และฟันกรามน้อย (Premolars) อย่างน้อยข้างบน ๖ ซี่ ข้างล่าง ๖ ซี่ ฟันหน้า (Incisors and canines) ข้างบน ๔ ซี่ ข้างล่าง ๔ ซี่ ฟันที่ถอนไปแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคง หรือด้วยวิธีทำสะพาน (Bridge) จึงให้นับเป็นจำนวนซี่ได้ตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- ๒.๖.๑.๑ ฟันเป็นรูฟันที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัสดุที่ไม่ถาวร
- ๒.๖.๑.๒ ฟันที่อุดหรือทำครอบไม่เรียบร้อย
- ๒.๖.๑.๓ ฟันน้ำนม
- ๒.๖.๑.๔ ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้องแล้ว
- ๒.๖.๑.๕ ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเกจนไม่สามารถที่จะจัดให้

สบกันได้กับฟันธรรมชาติ หรือฟันปลอม

๒.๖.๑.๖ มีการทำลาย...

- ๒.๖.๑.๖ มีการทำลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟัน เช่น กระดูก
เหงือก เยื่อหุ้มรากฟัน
- ๒.๖.๒ มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนแลดูน่าเกลียด
- ๒.๖.๓ การสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนทำให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเคี้ยว
อาหารธรรมดาไม่ได้ผล
- ๒.๖.๔ ถุงน้ำ (Cysts) การอักเสบที่เรื้อรัง โรคเหงือก อักเสบอย่างรุนแรง หรือพยาธิ
สภาพอื่นๆ ในปาก เช่น ฟันคุด ฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ ซึ่งสภาพการเช่นนี้ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อ
อวัยวะข้างเคียง หรือสุขภาพของผู้สมัคร
- ๒.๗ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
- ๒.๗.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั้ง ต่อนาที หรือมี
เอ.วี.บล็อก (A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติชนิดออริคิวลาร์ไฟบริลเลชัน หรือ ออริคิวลาร์ฟลัทเตอร์ (Auricular
fibrillation or Auricular flutter)
- ๒.๗.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มม. ของปรอท หรือต่ำกว่า ๑๐๐/๕๐ มม.
ของปรอท
- ๒.๗.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
- ๒.๗.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
- ๒.๗.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital heart diseases)
- ๒.๗.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง (Congestive heart failure)
- ๒.๗.๗ ลิ้นหัวใจพิการ
- ๒.๗.๘ อนิวริซึม (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ่
- ๒.๗.๙ หลอดเลือดดำขดอยู่ที่ถุงอัมตะ ขา หรือ แขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด
- ๒.๘ ระบบหายใจ
- ๒.๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซึ่งกำลังปรากฏอาการฟังกได้ชัดเจน
- ๒.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchitis
with emphysema)
- ๒.๘.๓ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ
- ๒.๘.๔ หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis)
- ๒.๘.๕ มีน้ำ หรือหนอง หรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด
- ๒.๘.๖ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)
- ๒.๘.๗ ปอดอักเสบหรือมีพยาธิสภาพอื่นๆ
- ๒.๘.๘ หืด (Bronchial asthma)
- ๒.๙ ระบบทางเดินอาหาร
- ๒.๙.๑ ฟิสตุล่า (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังท้อง
- ๒.๙.๒ ไส้เลื่อนทุกชนิด
- ๒.๙.๓ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้อัลตราซาวด์
- ๒.๙.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver)
- ๒.๙.๕ ฝีที่ตับ (Abscess of liver)

- ๒.๙.๖ ดีซ่าน
- ๒.๙.๗ ริตส์ดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
- ๒.๙.๘ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิ้นออกมาจากทวารหนัก
- ๒.๙.๙ ฝีคัณฑสูตร
- ๒.๑๐ ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
 - ๒.๑๐.๑ ไต กรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
 - ๒.๑๐.๒ นิ่ว
 - ๒.๑๐.๓ ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (Albumin)หรือ สีน้ำตาล
 - ๒.๑๐.๔ องคชาติถูกตัด หรือขาด
 - ๒.๑๐.๕ อัณฑะไม่ลงมาที่ถุงอัณฑะ หรือถูกตัดออก
 - ๒.๑๐.๖ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ (Hydrocele)
 - ๒.๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือ ท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis)
 - ๒.๑๐.๘ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis)
 - ๒.๑๐.๙ กามโรค
 - ๒.๑๐.๑๐ ผลการตรวจน้ำเหลืองวินิจฉัยว่าเป็นกามโรค
 - ๒.๑๐.๑๑ กระเทย (Femaphrodisim)
- ๒.๑๑ ระบบจิตประสาท
 - ๒.๑๑.๑ โรคจิต (Psychosis)
 - ๒.๑๑.๒ จิตทราม (Mental deficiency)
 - ๒.๑๑.๓ ใ้ (Aphasia)
 - ๒.๑๑.๔ อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
 - ๒.๑๑.๕ โรคลมชัก (Epilepsy)
- ๒.๑๒ เบ็ดเตล็ด
 - ๒.๑๒.๑ โรคที่เกี่ยวกับแพ้สาร โรคต่อมไร้ท่อ โรคที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึม และโรคที่เกี่ยวกับโภชนาการ (Allergy, Endocrine system, Metabolic and Nutritionaldisease)
 - ๒.๑๒.๑.๑ ธิยโรทอกซิโคซิส ไม่ว่าจะมึคอพอกด้วยหรือไม่ (Thyrotoxicosis with or without goitre)
 - ๒.๑๒.๑.๒ โรคคอพอก (Simple goitre)
 - ๒.๑๒.๑.๓ มิกซีเดมา (Myxedema)
 - ๒.๑๒.๑.๔ เบาหวาน (Diabetes mellitus)
 - ๒.๑๒.๑.๕ อะโครเมกาเลีย (Acromegaly)
 - ๒.๑๒.๑.๖ โรคอ้วนพี (Obesity)
 - ๒.๑๒.๒ โรคของเลือดและอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (Diseases of blood and bloodForming organs) ผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย
 - ๒.๑๒.๓ โรคติดเชื้อ หรือโรคติดจากปาราสิต (Infectiousand parasitic diseases)

๒.๑๒.๓.๑ โรคเรื้อน (Leprosy)

๒.๑๒.๒.๒ พิลาริโอซิส (Filariasis)

๒.๑๒.๓.๓ โรคคุดทะราด หรือรอกพื้น (Yaws)

๒.๑๒.๓.๔ โรคติดต่ออันตราย

๒.๑๒.๔ เนื้องอก (Neoplasm)

๒.๑๒.๔.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่

๒.๑๒.๔.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นแก่อวัยวะใด

(Malignantneoplasm of any organ)

๒.๑๒.๔.๓ โรคของต่อมน้ำเหลือง

๒.๑๓ โรคติดยาเสพติด

๒.๑๔ โรคเอดส์ (AIDS)

๒.๑๕ โรคหรือความพิการใดๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สมควร

รับเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
